

قارچ کش های تصویب شده از سال ۱۳۸۶ تا اردیبهشت ۱۴۰۳

ردیف	نام عمومی	نام تجاری	درصد	فرمولاسیون	شرکت	بیماری	محصول	کارنس	دز مصرف	تاریخ تصویب
۱	اپوکسی کونازول ۱۸۷ گرم /لیتر+تیوفانات متیل ۳۱۰ گرم/لیتر	رکس دو	۴۹/۷٪	SC	ب آ اس اف	بیماری فوزاریمی سنبله	گندم	۴۲ روز	۰/۵ لیتر در هکتار	۹۳/۳/۲۷
۲	اپوکسی کونازول ۱۸۷ گرم /لیتر+تیوفانات متیل ۳۱۰ گرم/لیتر	رکس دو	۴۹/۷٪	SC	ب آ اس اف	زنگ زرد	گندم	۴۲ روز	۰/۵ لیتر در هکتار	۹۷/۶/۲۷
۳	اپوکسی کونازول ۱۸۷ گرم /لیتر+تیوفانات متیل ۳۱۰ گرم/لیتر	رکس دو	۴۹/۷٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	چغندر قند	-	۰/۵ لیتر در هکتار	۹۷/۷/۱۶
۴	آزوکسی استروبین ۲۰۰ گرم/لیتر+ دیفنو کونازول ۱۲۵ گرم/لیتر	ارتیواتاپ	۳۲/۵٪	SC	سینجنتا	سفیدک پودری	جالیز- مزرعه.گلخانه	خیار: ۲ روز	مزرعه: ۱ لیتر در هکتار	۸۸/۹/۳۰
								گوجه فرنگی: ۲ روز	گلخانه: ۰/۷۵ در هزار	
۵	آزوکسی استروبین ۲۰۰ گرم/لیتر+ دیفنو کونازول ۱۲۵ گرم/لیتر	ارتیواتاپ	۳۲/۵٪	SC	سینجنتا	لکه برگ سرکوسپورایی	چغندر قند	-	۱ لیتر در هکتار	۹۹/۱۰/۲۲
۶	آزوکسی استروبین ۲۰۰ گرم/لیتر+ دیفنو کونازول ۱۲۵ گرم/لیتر	ارتیواتاپ	۳۲/۵٪	SC	سینجنتا	لکه موجی	گوجه فرنگی	۳ روز	۱۳۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۷	آزوکسی استروبین+ دیفنو کونازول	سفیر	۳۲/۵٪	SC	بارزگانان سرای سپند	سفیدک پودری	خیار گلخانه	-	۰/۷۵ در هزار حداکثر دو بار سمپاشی	۹۷/۷/۱۶
۸	آزوکسی استروبین+ دیفنو کونازول	دیفوروبین	۳۲/۵٪	SC	کاوش کیمیای کرمان	سفیدک پودری	خیار گلخانه	-	۰/۷۵ در هزار حداکثر دو بار سمپاشی	۹۷/۷/۱۶

۹	آزوکسی استروبین + سیپروکونازول	آمیستاراکسترا	۲۸٪	SC	سینجنتا	زنگ زرد	گندم	۳۵ روز	۰/۷۵ لیتر در هکتار	۹۲/۸/۲۷
۱۰	آزوکسی استروبین ۱۲۵g/l + دیفنوكونازول ۱۲۵ g/l	بیکانتا	۲۵٪	SC	سینجنتا	سپتوریای برگ	گندم		یک لیتر در هکتار	۱۴۰۱/۱۱/۳
۱۱	اسپیروکسامین	پروسپر	۳۰٪	CS	بایراگ	سفیدک سطحی	انگور	۱۴ روز	۰/۷ در هزار در مرحله جوانه زنی شاخه ها و با فاصله ۱۴ روز از سمپاشی اول با دز ۱/۲ در هزار	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۱۲	اسپیروکسامین + تبو کونازول + تریادیمنول	فالکن	۴۶٪	EC	بایراگ	زنگ زرد	گندم	۳۰ روز	۰/۶ لیتر در هکتار	۹۲/۸/۲۷
۱۳	اسپیروکسامین + تبو کونازول + تریادیمنول	فالکن	۴۶٪	EC	بایراگ	فوزاریوم سنبله	گندم	۳۰ روز	۰/۷-۰/۸ لیتر در هکتار	۹۴/۳/۲۵
۱۴	اکسی کلرور مس	اکسی کلرور پرتونار	۳۵٪	SC	پرتونار ویمال هند	سفیدک کرکی	خیار	۳-۷ روز	۳/۵ در هزار	۱۴۰۰/۶/۲۰
۱۵	اکسی کلرور مس	کیمیا کوپر اکسی	۳۵٪	SC	کاوش کیمیای کرمان شیام کمیکالز	سفیدک کرکی	خیار	۳-۷ روز	۳/۵ در هزار	۱۴۰۰/۶/۱
۱۶	اکسی کلرور مس	فلیت	۵۰٪	WP	بصیر شیمی پارس ایزاگرو ایتالیا	گموز فایتوفترایی طوقه پوسیدگی ریشه	مرکبات		۱۰۰ گرم در لیتر	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۱۷	اکسی کلرور مس + سیمو کسانیل	کوپروسیت سی	۴۳/۹۵٪	WP	دلتا پارس نهاده اگر یا	سفیدک داخلی	خیار	۵ روز	۳ کیلو گرم در هکتار	۹۴/۶/۲۳

۱۴۰۰/۹/۲۹	گلخانه ۶: در هزار	۳ روز	خيار	سفیدک کرکی	سینجنتا	WG	۱۶/۱۹٪	ریدومیل گلد آر	اکسی کلرور مس + مفنوکسام (متالاکسیل ام)	۱۸
	فضای باز: ۶ کیلوگرم در هکتار (دوبار سمپاشی در فصل زراعی به فاصله ۱۴ روز)									
۹۹/۱۱/۶	۲ در هزار	-	گردو	آنتراکنوز	رها اندیش کاوان	WG	۴۵٪	ردشیلد	اکسید مس	۱۹
۹۱/۶/۲۰	۱ در هزار	۱۵ روز	درختان میوه دانه دار	آتشک	نوردوکس آ.اس نروژ	WG	۷۵٪	نوردوکس	اکسید مس	۲۰
۹۰/۴/۱۳	۲/۵ در هزار	۱۵ روز	هلو	پیچیدگی برگ	نوردوکس آ.اس نروژ	WG	۷۵٪	نوردوکس	اکسید مس	۲۱
۹۴/۷/۶	۱ کیلوگرم در هکتار	۱۵ روز	سیب زمینی	سفیدک داخلی	نوردوکس آ.اس نروژ	WG	۷۵٪	نوردوکس	اکسید مس	۲۲
۱۴۰۱/۵/۱۰	۲ در هزار	۱۵ روز	درختان میوه هسته دار	شانکر باکتریایی <i>Pseudomonas syringae</i>	رها اندیش کاوان Nordox	WG	۴۵٪	رد شیلد	اکسید مس	۲۳
۹۶/۴/۱۹	۱۳۰ گرم برای یکصد کیلوگرم بذر	-	برنج	پوسیدگی طوقه و ریشه	نوردوکس آ.اس نروژ	WG	۷۵٪	نوردوکس	اکسید مس	۲۴
۱۴۰۰/۹/۲۹	۱/۵ لیتر در هکتار (خزانة)	-	توتون	سفیدک داخلی	پیرا کشت Zhejiang Heben Pesticides and chemical	SC	۳۱/۸٪	نوردوکسیل	اکسید مس (نوردوکس) ۲۵/۸٪+متالاکسیل ۶٪	۲۵
	۲ لیتر در هکتار (مزرعه)									

۲۶	اکسی کلرور مس (دارای ۵۸/۳٪ مس)	کوپراکسی کلرید مس برزگر	۸۵٪	WP	برزگر برجسته Agro life Science corporation	پیچیدگی برگ	هلو	-	۴ در هزار	۱۴۰۰/۹/۱۵
۲۷	اکسی کلرور مس	کوپر پلاس	۵۰٪	WP	آرمان سبز آدینه شیام کمیکالز	سفیدک کرکی	گوجه فرنگی	۳ روز	۲ در هزار	۱۴۰۰/۴/۱۴
۲۸	آمتوکترا دین + دیمتومورف	اوروگو	۵۲/۵٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک داخلی	خیار (فضای باز و گلخانه)	۱ روز	۰/۷ در هزار استفاده بیش از دو نوبت متوالی و بیش از چهار نوبت در یک دوره تولید ممنوع است.	۹۷/۱۰/۱۷
۲۹	آمتوکترا دین + دیمتومورف	اوروگو	۵۲/۵٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک داخلی	هندوانه	۱ روز	۰/۷ در هزار در فواصل زمانی ۷-۱۰ روز جهت کنترل بیماری	۹۹/۲/۸
۳۰	آمتوکترا دین + دیمتومورف	اوروگو	۵۳/۵٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک داخلی	انگور	۱ روز	۱ در هزار، در فواصل زمانی ۷-۱۰ روز جهت کنترل بیماری	۹۹/۴/۳۰
۳۱	پنفلوفن	امستوپرایم	۵٪	FS	بایر	شانکر ریزو کتونایی و شوره سیاه	سیب زمینی		۴۰۰ میلی لیتر برای ۱۰۰۰ کیلوگرم غده بذری به صورت ضد عفونی	۱۴۰۲/۴/۱۹
۳۲	ایپرودیون	رورال	۵۰٪	WP	بایر آگ	شانکر ریزو کتونایی ساقه و شوره سیاه غده	سیب زمینی	-	۲٪ وزن غده	۸۶/۱۰/۱۰
۳۳	ایپرودیون ۱۷۵ + کاربندازیم ۸۵ (گرم / لیتر)	رست آپ	۲۶٪	SC	پاک سم ایرانیان jiangsu Lanfeng	شانکر ریزو کتونایی ساقه و شوره سیاه غده	سیب زمینی	-	۴ لیتر به ازای ۱۰۰۰ کیلوگرم غده بذری	۹۹/۴/۳۰

۹۶/۳/۱	۱/۲۵ لیتر در هکتار	۱۴ روز	برنج	بلاست	مشکفام فارس نیپون نوهیاکو	EC	۴۰٪	فوجی وان	ایزوپروتیولان	۳۴
۹۲/۴/۱۷	۰/۷۵-۰/۵ کیلوگرم در هکتار	۱ روز	خیار	سفیدک پودری	نیپون سودا	WP	۴۰٪	بلکیوت	ایمینو کتادین تریس	۳۵
۹۳/۳/۱۲	۷۵۰ گرم در هکتار	۷ روز	سیب زمینی	لکه موجی (آلترناریا)	نیپون سودا	WP	۴۰٪	بلکیوت	ایمینو کتادین تریس	۳۶
۹۵/۸/۲۴	۰/۷۵ در هزار	۷ روز	انگور	سفیدک پودری	نیپون سودا	WP	۴۰٪	بلکیوت	ایمینو کتادین تریس	۳۷
۹۷/۲/۲۴	۱۸۰ گرم در هکتار	۲ روز	برنج	بلاست	گیاه پرنیان اطلس Deqiang Biology	WP	۵٪	کانگ می	باسیلوس سوبتیلیس	۳۸
۱۴۰۱/۴/۲۰	۱/۲۵ در هزار	-	گوجه فرنگی	لکه موجی آلترناریایی	گیاه پرنیان اطلس Deqiang Biology	WP	۵٪	کانگ می	باسیلوس سوبتیلیس	۳۶
۹۸/۸/۲۷	در سه مرحله به ترتیب با دزهای ۵، ۴ و ۵ لیتر در هکتار	ندارد	گوجه فرنگی گلخانه	پژمردگی فوزاریوم	رویون تیسان	SC	۱۰ ^۸	پارس باسیل	باسیلوس ولزنسیس	۴۰
۹۸/۱۰/۹	۵ در هزار	ندارد	توت فرنگی گلخانه	کپک خاکستری	بایرآلمان	SC	۱۰ ^{۱۲}	سرناد	باسیلوس سوبتیلیس <i>Bacillus subtilis</i>	۴۱

۴۲	باسیلوس سوبتیلیس <i>Bacillus subtilis</i>	سرنا	۱۰ ^{۱۲}	SC	بایر آلمان	پژمردگی فوزاریومی	گوجه فرنگی گلخانه	ندارد	۱۰ لیتر در هکتار به روش خیساندن خاک پس از انتقال نشاء	۱۴۰۰/۹/۲۲
۴۳	باسیلوس سوبتیلیس	روبین ۱	۱۰ ^۷	پودر مرطوب	زیست فناوری سبز	پوسیدگی ریزوکتونایی ریشه	چغندر قند	ندارد	۲۰۰ گرم در هکتار، ۴۵ و ۹۰ روز پس از کاشت	۹۹/۴/۳۰
۴۴	بردو	میشو بردوکس	۱۸٪	SC	سبزآور پردیس	بیماری غربالی	زردآلو	۷ روز	۱۰ در هزار دو مرحله	۹۳/۱۲/۴
۴۵	بردو	بردو کیمیا	۱۸٪	SC	کاوش کیمیا کرمان	شانکر سیتوسپرای	درخت سیب	۷ روز	۲ درصد محلول پاشی توأم با پانسمان شانکر با بردو کیمیا ۸ درصد	۹۴/۱۰/۷
۴۶	بردو ماده موثره سولفات مس و هیدروکسید کلسیم	بردو بهسم	۱۸٪	SC	البرز بهسم	غربالی	زردآلو	۷ روز	۱۰ در هزار	۹۶/۱۱/۱۶
۴۷	بردو	بردوسیف	۱۸٪	SC	سبزآور نگین فلات	آتشک	درختان میوه دانه دار	۷ روز	۸ در هزار در مرحله جوانه و ۵ در هزار در مرحله ۵ درصد، ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد گل	۹۶/۲/۲۵
۴۸	بردو	بردوسیف	۱۸٪	SC	سبزآور نگین فلات	سفیدک داخلی	خیار (گلخانه)	-	۵ در هزار	۹۷/۹/۲۶
۴۹	بردو	بردوسیف	۱۸٪	SC	سبزآور نگین فلات	پیچیدگی برگ	هلو	-	۸ در هزار	۹۸/۳/۲۷
۵۰	بردو	بردو سمیران	۲۰٪	SC	سمیران	پیچیدگی برگ	هلو	۷ روز	۵-۸ در هزار در زمان ریش برگ-ها در پاییز و تورم جوانه-ها در بهار	۹۶/۳/۱

۹۷/۹/۲۶	۵ در هزار	-	خیار(گلخانه)	سفیدک داخلی	اکسین شیمی آدان	SC	۲۰٪	بردوکسین	بردو	۵۱
۹۷/۹/۲۶	۵ در هزار	-	خیار(گلخانه)	سفیدک داخلی	پرتونار	SC	۲۰٪	بردوتکس	بردو	۵۲
۹۸/۳/۲۷	۹ در هزار	-	هلو	پیچیدگی برگ	پرتونار	SC	۲۰٪	بردوتکس	بردو	۵۳
۹۷/۳/۲۸	۵ در هزار	۷ روز	گوجه فرنگی	سفیدک داخلی	باغبان تاک	SC	۱۸٪	بردوفیکس	بردو	۵۴
۹۷/۸/۱۴	۱۰ در هزار در مرحله جوانه و ۴ در هزار در مرحله ۵، ۵۰ و ۱۰۰ درصد گل	۷ روز	دانه دار	آتشک درختان میوه	باغبان تاک	SC	۱۸٪	بردوفیکس	بردو	۵۵
۹۸/۳/۲۷	۲/۵ در هزار	-	انگور	سفیدک پودری	باغبان تاک	SC	۸۰٪	سولفیکس	بردو	۵۶
۹۸/۳/۲۷	۱۰ در هزار	-	هلو	پیچیدگی برگ	باغبان تاک	SC	۱۸٪	بردوفیکس	بردو	۵۷
۹۷/۹/۲۶	۵ در هزار	-	خیار(گلخانه)	سفیدک داخلی	باغبان تاک	SC	۱۸٪	بردوفیکس	بردو	۵۸
۹۷/۱۲/۱۳	۹ در هزار	-	زردالو	غربالی	گیاه	SC	۲۰٪	بردوجی	بردو	۵۹
۹۹/۴/۳۰	۱۵ در هزار	-	زردالو	غربالی	فراورده های طیف سبز	SC	۱۸٪	بردوطیف	بردو	۶۰
۱۴۰۰/۹/۱۵	۵ لیتر در هکتار	۳ روز	سیب زمینی	سفیدک کرکی	خزرسم کود مانیکا ایتالیا	SC	۱۰٪	MANIFLOW	مخلوط بردو	۶۱
۹۹/۶/۲۴	۳ کیلوگرم در هکتار در تناوب با سایر قارچ کش های ثبت شده	۷ روز	خیار	سفیدک کرکی	خزرسم کود مانیکا ایتالیا	WP	۳۳٪	توتور	مخلوط بردو ۱۵٪(CU) + فوزتیل آلومینیوم ۱۸٪	۶۲

۶۳	بوسکالید+ پیراکلواستروبین	یونیلیس	۳۸٪	WG	بازرگانان سرای سپند پارس Shandong Kangqiao	سفیدک پودری	گوجه فرنگی	-	یک در هزار (حداکثر دو بار در سال)	۹۸/۱۰/۳۳
۶۴	بوسکالید+ پیراکلواستروبین	بلیس	۳۸٪	WG	ب آ اس اف	سفیدک پودری	هلو- شلیل	۷ روز	۰/۷ در هزار مناطق خشک، ۱ در هزار مناطق مرطوب	۸۹/۹/۲۹
۶۵	بوسکالید+ پیراکلواستروبین	بلیس	۳۸٪	WG	ب آ اس اف	سفیدک پودری	سیب درختی	-	۰/۷ در هزار و در تناوب با سایر قارچکش-ها و حداکثر دوبار در سال	۹۷/۱۲/۱۳
۶۶	بوسکالید+ پیراکلواستروبین	سیگنوم	۳۳/۴٪	WG	ب آ اس اف	آلترناریا	گوجه فرنگی	۳ روز	۰/۵ کیلوگرم در هکتار	۹۴/۱۲/۱۰
۶۷	بوسکالید+ پیراکلواستروبین	سیگنوم	۳۳/۴٪	WG	ب آ اس اف	آلترناریا	سیب زمینی	۳ روز	۰/۵ کیلوگرم در هکتار	۹۵/۳/۱۷
۶۸	بوسکالید+ پیراکلواستروبین	سیگنوم	۳۴/۴٪	WG	ب آ اس اف	کپک خاکستری	توت فرنگی گلخانه	۳ روز	۱/۵ در هزار و در تناوب با سایر قارچ-کش-ها و حداکثر دوبار در سال	۹۸/۱۱/۲۸
۶۹	بوسکالید+ پیراکلواستروبین	سیگنوم	۳۳/۴٪	WG	ب آ اس اف	افتادگی برگ	کاهو	۳ روز	۱/۵ کیلو گرم در هکتار حداکثر دو مرحله و با رعایت فاصله ۱۴	۹۹/۳/۱۲
۷۰	بوسکالید+ پیراکلواستروبین	سیگنوم	۳۳/۴٪	WG	ب آ اس اف	کپک خاکستری	خیار	۳ روز	۱/۲۵ در هزار	۱۴۰۰/۷/۲۶
۷۱	بوسکالید+ کرزوکسیم متیل	کولیس	۳۰٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	هلو- شلیل	۷ روز	۰/۵ در هزار	۸۹/۹/۲۹
۷۲	بوسکالید+ کرزوکسیم متیل	کولیس	۳۰٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	خیار	-	۰/۴ در هزار	۹۶/۹/۱۳
۷۳	بوسکالید+ کرزوکسیم متیل	کولیس	۳۰٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	گوجه فرنگی (فضای باز)	-	۰/۵ در هزار	۹۸/۴/۱۰

۹۰/۱۲/۱	۵ در هزار	-	جالیز - گلخانه	سفیدک پودری	کیمیا سبز آور	SP	۸۵٪	کالیبان	بی کربنات پتاسیم	۷۴
۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۰/۷ در هزار	-	انگور	سفیدک پودری	سینجنتا	SC	۲۰٪	میراویس دیوو	پایدیفلومتوفن ۷۵ (آدپیدین) گرم/کیلو گرم+دیفنو کونازول ۱۲۵ گرم/کیلو گرم	۷۵
۱۴۰۲/۵/۳۰	۰/۸ در هزار	-	سیب	سفیدک پودری	سینجنتا	SC	۲۰٪	میراویس دیوو	پایدیفلومتوفن ۷۵ (آدپیدین) گرم/کیلو گرم+دیفنو کونازول ۱۲۵ گرم/کیلو گرم	۷۶
۹۷/۱۲/۱۳	یک لیتر در هکتار	-	گندم	زنگ زرد	بهاور شیمی آستک	EC	۲۵٪	بهتیل	پروپیکونازول	۷۷
۹۹/۶/۲۴	۴۰۰ میلی لیتر در هکتار	۲۱	گندم	سپتوریوز	گیاه پر نیان اطلس Safa tarim	EC	۳۰٪	هاربور	پروپیکونازول ۱۵ درصد+ دیفنو کونازول ۱۵ درصد	۷۸
۸۹/۳/۱۰	۱۵-۱۰ میلی لیتر برای یکصد کیلو گرم بذر	-	گندم	سیاهک پنهان معمولی	بایر آگ	FS	۴۰٪	لاماردور	پروتیو کونازول + تیو کونازول	۷۹
۸۹/۹/۱	۲۰ میلی -لیتر برای یکصد کیلو گرم بذر	-	گندم	سیاهک آشکار	بایر آگ	FS	۴۰٪	لاماردور	پروتیو کونازول + تیو کونازول	۸۰
۹۶/۴/۱۹	۱۵ میلی -لیتر برای یکصد کیلو گرم بذر	-	جو	سیاهک آشکار	بایر آگ	FS	۴۰٪	لاماردور	پروتیو کونازول + تیو کونازول	۸۱

۱۴۰۳/۲/۳	نیم در هزار	-	گندم	سیاهک پنهان معمولی	بایر آگ	FS	۱۷٪	ردیگو پرو	پروتیوکونازول گرم /لیتر +۱۵۰ تیوکونازول ۲۰ گرم /لیتر	۸۲
۹۲/۷/۸	۳ لیتر در هکتار در مزرعه به صورت شنی در گلخانه به منظور ضد عفونی خاک جهت کنترل عامل بیماری فوق به مقدار ۰/۳ لیتر در هر متر مکعب خاک به صورت مخلوط با خاک	۳ روز	خیار	بوته میری	بایر آگ	SL	۸۴٪	پرویکورانتری	پروپامو کارب هیدرو کلراید و فوزتیل آلومینیوم	۸۳
۹۲/۸/۷	۲ در هزار	۱ روز	خیار- گلخانه	سفیدک داخلی	بایر آگ	SC	۶۸/۷۵٪	اینفینیتو	پروپامو کاب هیدروکلراید+ فلوپیکولید	۸۴
۹۴/۷/۶	۱/۲ لیتر در هکتار	۷ روز	سیب زمینی	سفیدک داخلی	بایر آگ	SC	۶۸/۷۵٪	اینفینیتو	پروپامو کاب هیدروکلراید+ فلوپیکولید	۸۵
۹۴/۷/۶	۲/۵ لیتر در هکتار	-	سیب زمینی	سفیدک داخلی	بازرگان کالا Arysta life science	SC	۴۵٪	پروکسانیل	پروپامو کرب هیدروکلراید+ سیموکسانیل	۸۶
۱۴۰۰/۹/۲۹	۲ در هزار ۲ لیتر در هکتار در فضای باز	۳-۷ روز	خیار	سفیدک داخلی	دلتا پارس نهاده آگرایا	SC	۴۵٪	ریوالدو	پروپامو کرب هیدروکلراید+ سیموکسانیل	۸۷

۸۸	پروپامو کارب هیدروکلراید	پروپلنت	۷۲/۲٪	SL	بازرگان کالا Arysta life science	بوته میری <i>Pythiumaph nidermatum</i>	خیار	-	۱ در هزار در زمان کشت بذر و انتقال نشا و ۰/۷۵ در هزار دو هفته پس از انتقال نشا	۹۶/۱۱/۳۰
۸۹	پروپیکونازول + فلوکسایپروکساید + پیراک لواستروبین	اینور	۳۵/۵٪	EC	ب آ اس اف	زنگ زرد	گندم	-	نیم لیتر در هکتار	۹۷/۱۲/۱۳
۹۰	پروکلراز	آکورد	۵۰٪	WP	فرتی اگرو	پوسیدگی خشک	قارچ خوراکی	-	۰/۹ گرم در هر متر مربع	۹۲/۸/۲۷
۹۱	مونسرن	پنسیکرون	۲۵٪	FS	بایرا گ	شانکر ریزوکتونیایی	سیب زمینی	-	۱-۱/۲۵ در هزار (ضد عفونی بذر)	۹۹/۴/۳۰
۹۲	پیراکلواستروبین + دیمتومورف	پیرادیم	۱۸/۷٪	DF	برزگر برجسته Jiangsu Greenscie Chemical	سفیدک داخلی	خیار (گلخانه)	-	۰/۳۵ در هزار (بیش از سه نوبت متوالی و بیش از شش نوبت در یک دوره تولید ممنوع است).	۹۷/۱۰/۱۷
۹۳	پیراکلواستروبین + دیمتومورف	پیرادیم	۱۸/۷٪	DF	برزگر برجسته Jiangsu Greenscie Chemical	سوختگی الترناریایی	پسته	-	۰/۷۵ در هزار	۱۴۰۱/۴/۲۰
۹۴	پیراکلواستروبین + فلوکسایپروکساید	پریاکسور	۲۲/۵٪	EC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	گندم	-	۱/۵ لیتر در هکتار	۹۹/۳/۱۲
۹۵	پیری متانیل	میلیس	۳۰٪	SC	گیاه پر نیان اطلس Safa tarim	کپک خاکستری	توت فرنگی گلخانه	-	یک در هزار و در تناوب با سایر قارچ-کش ها و حداکثر دوبار در سال	۹۸/۱۱/۲۸

۹۶	<i>Pythium Oligandrum</i> Drechsler	پلی ورسوم		WP	بازارگان کالا Biopreparaly	عامل پیشگیرانه بیماری گیاهچه میری	خیار گلخانه	-	۰/۳-۰/۴ در هزار در طول فصل رویش همراه با آب آبیاری دوبار در فصل کاشت	۱۴۰۰/۹/۱۵
۹۷	تالارومیسس فلاووس	تالارومین	۱۰ ^۹	ذرات جامد قابل انتشار در آب	بهاران دشت ساحل	پژمردگی ورتیسیلیومی	سیب زمینی	ندارد	۶۰ کیلوگرم برای بذرمال کردن ۴ تن غده سیب زمینی در هکتار	۹۷/۲/۳۰
۹۸	تبوکونازول	فولیکور	۲۵٪	EW	بایر آگ	پوسیدگی اسکلروتینیایی	ساقه کلزا	-	۱ لیتر در هکتار	۹۴/۳/۱۱
۹۹	تبوکونازول	آرتمیس	۶٪	FS	بیستر فیلد	سیاهک پنهان معمولی	گندم	-	۵۰ میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	۹۵/۹/۲۹
۱۰۰	تبوکونازول	تبوکور	۲۵٪	EW	گل سم گرگان نینگ بوسانجوی	زنگ زرد	گندم	-	یک لیتر در هکتار	۹۷/۱۲/۱۳
۱۰۱	تبوکونازول	تایدتو	۴۰٪	SC	گیاه پرنیان اطلس تاید کراپ-ساینس	زنگ زرد	گندم	-	۰/۴ لیتر در هکتار	۹۷/۱۲/۱۳
۱۰۲	تتراکونازول	لوسپل	۱۲/۵٪	LS	ایزاگرو	سیاهک آشکار سیاهک پنهان	گندم	-	۱۰۰ میلی لیتر برای ضد عفونی یکصد کیلوگرم بذر ۳۰ میلی لیتر برای ضد عفونی یکصد کیلوگرم بذر	۸۹/۱۰/۱۳
۱۰۳	تبوکونازول + آزوکسی استروبین	آذیلون	۳۲٪	SC	آریاشیمی Ningbo + Sunjoy Jiangsu	سفیدک پودری	رز	-	یک در هزار	۹۸/۱۰/۲۳

۱۴۰۱/۴/۲۰	۰/۶ در هزار	-	هلو	سفیدک پودری	بازرگان کالا Isagro	SC	۱۸٪	آفیانس	تتراکونازول+آزوکسی استروبین	۱۰۴
۱۴۰۲/۳/۲۹	۶۰۰ میلی لیتر در هکتار	۳ روز	گوچه فرنگی	لکه موجی	بازرگان کالا Isagro	SC	۱۸٪	آفیانس	تتراکونازول+آزوکسی استروبین	۱۰۵
۱۴۰۰/۹/۱	۶ دهم لیتر در هکتار	-	گندم	سفیدک پودری	ساعی گل تهران Jiangsu Mindleader crop science	SC	۳۰٪ (۳۴۵ گرم/لیتر)	پیلارتن	تتوکونازول + پیراکلواستروبین	۱۰۶
۸۸/۸/۱۱	۰/۵ لیتر در هکتار در مزرعه	۳ روز	جالیز	سفیدک پودری	ایزاگرو	EC	۱۰٪	دومارک	تتراکونازول	۱۰۷
	۰/۴ در هزار در گلخانه									
۹۲/۳/۲۷	۰/۳ در هزار	۱۴ روز	سیب	سفیدک پودری	ایزاگرو	EC	۱۰٪	دومارک	تتراکونازول	۱۰۸
۹۰/۷/۴	۰/۸-۱ لیتر در هکتار	۲۱ روز	چغندر قند	سفیدک پودری	ایزاگرو	ME	۱۲/۵٪	امی ننت	تتراکونازول	۱۰۹
۸۹/۳/۱۰	۱۵۰ گرم برای یکصد کیلوگرم بذر	-	جو	سیاهک آشکار	بایر آگ	DS	۷/۵٪	بایتان	تریادیمنول	۱۱۰
۸۹/۳/۱۰	۲۰ میلی لیتر برای ضد عفونی یکصد کیلوگرم بذر	-	جو	سیاهک آشکار	ب آ اس اف	FS	۲۰٪	رنال	تری تیکونازول	۱۱۱
۸۸/۸/۱۱	۲۰۰ گرم در هکتار	۱ روز	جالیز- مزرعه	سفیدک پودری	بایر آگ	WG	۵۰٪	فلینت	تری فلوکسی استروبین	۱۱۲
۹۶/۵/۲	۲۵۰ گرم در هکتار	۱ روز	گوچه فرنگی- مزرعه	سفیدک پودری	بایر آگ	WG	۵۰٪	فلینت	تری فلوکسی استروبین	۱۱۳

۹۲/۳/۶	۱۶۰ گرم در هکتار	۲۱ روز	برنج	بلاست	بایر آگ	WG	۷۵٪	ناتیوو	تری فلوکسی استروبین + تبوکونازول	۱۱۴
۹۴/۵/۱۲	۰/۳-۰/۲ در هزار	۱۴ روز	سیب	لکه سیاه	بایر آگ	WG	۷۵٪	ناتیوو	تری فلوکسی استروبین + تبوکونازول	۱۱۵
۹۵/۶/۱	۰/۳ در هزار	۱۴ روز	سیب	سفیدک پودری	بایر آگ	WG	۷۵٪	ناتیوو	تری فلوکسی استروبین + تبوکونازول	۱۱۶
۹۵/۶/۱	۲۰۰ گرم در هکتار	-	چغندر قند	سفیدک پودری	بایر آگ	WG	۷۵٪	ناتیوو	تری فلوکسی استروبین + تبوکونازول	۱۱۷
۹۶/۹/۱۳	۱۶۰ گرم در هکتار	۲۱ روز	برنج	شیت بلایت	بایر آگ	WG	۷۵٪	ناتیوو	تری فلوکسی استروبین + تبوکونازول	۱۱۸
۹۸/۱۱/۱۴	۱۶۰ گرم در هکتار	۲۱ روز	برنج	بلاست	بازرگانان سرای سپند پارس CAC Nantong	WG	۷۵٪	فلونازول	تری فلوکسی استروبین + تبوکونازول	۱۱۹
۹۸/۱۱/۱۴	۳۲۰ میلی لیتر در هکتار	-	برنج	بلاست	پاک سم ایرانیان &sunjoy CAC Nanton	SC	۳۷/۵٪	تیلما	تری فلوکسی استروبین + تبوکونازول	۱۲۰
۹۸/۱۱/۱۴	۱۶۰ گرم در هکتار	-	برنج	بلاست	گل سم گرگان &sunjoy CAC Nanton	WG	۷۵٪	ایوت	تری فلوکسی استروبین ۵۰٪ + تبوکونازول ۲۵٪	۱۲۱
۹۶/۲/۲۵	۰/۲ در هزار	۱۴ روز	سیب	سفیدک پودری	بایر آگ	SC	۵۰٪	لونا سن سیشن	تری فلوکسی استروبین + فلوپیرام	۱۲۲
۹۶/۳/۱	۰/۲ در هزار	۱۴ روز	سیب	لکه سیاه	بایر آگ	SC	۵۰٪	لونا سن سیشن	تری فلوکسی استروبین + فلوپیرام	۱۲۳

۱۲۴	تری فلوکسی استروبین + فلوپیرام	لونا سن سیشن	۵۰٪	SC	بایر آگ	سفیدک پودری	خیار-گلخانه	۳ روز	۰/۲ در هزار	۹۶/۳/۱
۱۲۵	تری فلوکسی استروبین + فلوپیرام	لونا سن سیشن	۵۰٪	SC	بایر آگ	سفیدک پودری	گوجه فرنگی- مزرعه	۵ روز	۲۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۶/۵/۲
۱۲۶	تری فلوکسی استروبین + فلوپیرام	لونا سن سیشن	۵۰٪	SC	بایر آگ	کپک خاکستری	خیار	-	۴ دهم در هزار	۱۴۰۰/۷/۲۶
۱۲۷	تری فلومیزول	تریفمین	۱۵٪	EC	رهااندیش کاوان نپون سودا	سفیدک پودری	درختان سیب	-	یک در هزار	۹۹/۱۰/۹
۱۲۸	تری فلومیزول + سایفلوفنامید	پانچو تی اف	۱۸/۴٪	WG	رهااندیش کاوان نپون سودا	سفیدک پودری	هلو	۱۴ روز	۷۵ / ۰ در هزار	۹۹/۱۰/۱
۱۲۹	تری فلومیزول + سایفلوفنامید	پانچو تی اف	۱۸/۴٪	WG	رهااندیش کاوان نپون سودا	مومیایی	هلو	۱۵ روز	۷۵ / ۰ در هزار	۱۴۰۰/۴/۱۴
۱۳۰	تریفورین	ساپرول	۱۹٪	DC	سومیتومو	لکه آجری	بادام	-	۰/۳ در هزار	۹۶/۱۱/۳۰
۱۳۱	تریتیوکونازول + پیراکلواستروبین	اینشورپر فرم	۱۲٪	FS	ب آ اس اف	سیاهک پنهان معمولی	گندم	-	۰/۴- ۰/۵ در هزار	۹۸/۱۲/۲۸
۱۳۲	تریتیوکونازول + پیراکلواستروبین	اینشورپر فرم	۱۲٪	FS	ب آ اس اف	سیاهک آشکار	گندم	-	۰/۵ در هزار	۱۴۰۰/۹/۱

۹۹/۳/۲۶	۳۰۰ سی سی در هکتار در تناوب با سایر قارچ کش ها	۲۱ روز	برنج	سوختگی غلاف برگ برنج(شیت بلایت)	گروه شهر سبز و سلامت پارسیان Shandong kangqiao	SC	۲۴٪	آچمز	تیفلوزامید	۱۳۳
۹۰/۳/۳۰	۰/۴-۰/۵ کیلوگرم در هکتار	۲۱ روز	برنج	بلاست برگ و خوشه	نیپون سودا ژاپن	WP	۷۲/۵٪	ویستا	تیوفانات متیل + تری سیکلازول	۱۳۴
۹۱/۲/۹	۳۰-۴۰ گرم برای هزار گیاه	ندارد	گوجه فرنگی گلخانه	پژمردگی فوزاریومی	گیاه کوپرت هلند	WP	۱۰ ^۹	تریانوم پی	تریکودرما هارزیانوم	۱۳۵
۹۱/۲/۹	۳۰-۴۰ گرم برای هزار گیاه	ندارد	خیار گلخانه	پژمردگی فوزاریومی	گیاه کوپرت هلند	WP	۱۰ ^۹	تریانوم پی	تریکودرما هارزیانوم	۱۳۶
۹۷/۹/۲۱	۱۵-۲۰ کیلوگرم در هکتار	ندارد	طالبی	پژمردگی فوزاریومی	گیاه کوپرت هلند	G	۱۰ ^۹	تریانوم جی	تریکودرما هارزیانوم	۱۳۷
۹۷/۹/۲۱	۲۵۰-۳۷۵ گرم در متر مکعب	ندارد	گوجه فرنگی گلخانه	پژمردگی فوزاریومی	گیاه کوپرت هلند	G	۱۰ ^۸	تریانوم جی	تریکودرما هارزیانوم	۱۳۸
۱۴۰۲/۵/۳۰	۰/۷۵ در هزار	۴۵ روز	سیب	لکه سیاه	ب آ اس اف	SC	۵۰٪	دلان	دیتیانون	۱۳۹
۸۹/۳/۱۰	۲۰۰ میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	-	جو	سیاهک آشکار	سینجنتا	FS	۳/۶۳٪	دیویدند استار	دیفنوکونازول + سایپرو کونازول	۱۴۰

۱۴۱	دیفنو کونازول + سایپرو کونازول	دیویدند استار	۳/۶۳%	FS	سینجنتا	سیاهک آشکار	گندم	-	۱۰۰ میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	۸۹/۹/۱
۱۴۲	دیفنو کونازول + سیفلوفنامید	سیدلی تاپ	۱۴%	DC	سینجنتا	سفیدک پودری	خیار در شرایط گلخانه-ای	-	۱ در هزار (عدم کاربرد بیش از دو نوبت در طول یک فصل)	۹۷/۸/۱۴
۱۴۳	دیفنو کونازول + فلوکسایپروکساد (xemium)	داگونیس	۱۲/۵%	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	خیار گلخانه-ای	۳ روز	۰/۵ در هزار	۹۹/۱۰/۲۲
۱۴۴	دیفنو کونازول + فلوکسایپروکساد (xemium)	داگونیس	۱۲/۵%	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	سیب	۳ روز	۰/۶ در هزار	۱۴۰۰/۹/۲۲
۱۴۵	دیفنو کونازول + فلوکسایپروکساد (xemium)	داگونیس	۱۲/۵%	SC	ب آ اس اف	لکه سیاه سیب	سیب	-	۰/۶ در هزار	۱۴۰۰/۱۲/۹
۱۴۶	دیفنو کونازول + فلوکسایپروکساد (xemium)	داگونیس	۱۲/۵%	SC	ب آ اس اف	لکه موجی	سیب زمینی	۷ روز	۷۵۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۱/۷/۲۵
۱۴۷	دیفنو کونازول + فلوکسایپروکساد (xemium)	داگونیس	۱۲/۵%	SC	ب آ اس اف	لکه موجی	گوجه فرنگی	۳ روز	۱۲۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۲/۳/۲۹
۱۴۸	دیفنو کونازول ۵۰ گرم/لیتر + فلوکسایپروکساد ۷۵ گرم/لیتر (xemium)	داگونیس	۱۲/۵%	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	توت فرنگی		۰/۶ در هزار	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۱۴۹	دیمتومورف + پیراکلوستروبین	کابریو دو	۱۱/۲%	EC	ب آ اس اف	آلترناریا	گوجه فرنگی	۳ روز	۲ لیتر در هکتار	۹۴/۱۲/۱۰
۱۵۰	دیمتومورف + مانکوزب	آکروبات ام زد	۶۹%	WG	ب آ اس اف	سفیدک داخلی	سیب زمینی	۷ روز	۲ کیلوگرم در هکتار	۹۴/۸/۲۵
۱۵۱	سایپرو کونازول + کاربندازیم	آلتو کمی	۴۲%	SC	سینجنتا	پوسیدگی اسکروتنیایی	ساقه کلزا	-	۱ لیتر در هکتار	۹۴/۳/۱۱
۱۵۲	سیازوفامید	رانمن	۴۰%	SC	ایشیهارا	سفیدک داخلی	خیار - گلخانه	۳ روز	۰/۴-۰/۵ در هزار	۹۱/۳/۸

۱۵۳	سیازوفامید	رانمن	۴۰٪	SC	ایشیهارا	بادزدگی	سیب زمینی	-	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار	۹۴/۷/۶
۱۵۴	سیازوفامید	رانمن	۱۰٪	SC	ایشیهارا	سفیدک داخلی	خیار- گلخانه	۳ روز	۱/۵ در هزار	۹۶/۵/۲
۱۵۵	سیازوفامید	رگنانت	۲۰٪	SC	بازرگانان سرای سپند پارس شاندوگ هایلر	سفیدک داخلی	خیار(گلخانه)	-	۰/۶ در هزار(بیش از سه نوبت متوالی و بیش از شش نوبت در یک دوره تولید ممنوع است).	۹۷/۱۰/۱۷
۱۵۶	سولفور	سولفولاک	۸۰٪	WG	بیسترفیلد	سفیدک پودری	خیار	۱ روز	۳ کیلوگرم در هکتار	۹۲/۴/۱۷
۱۵۷	سولفور	گوگرد سمیران	۸۰٪	SC	سمیران	سفیدک پودری	انگور	-	۲/۵ در هزار	۹۲/۸/۲۷
۱۵۸	سولفور	سولفور ارکیده سازان	۴۰٪	SC	ارکیده سازان	سفیدک پودری	شلیل	۲۰ روز	۳/۷۵ در هزار	۹۳/۶/۱۰
۱۵۹	سوافور	پارومی دی	۸۰٪	DF	آریا شیمی کروماندل	سفیدک پودری	خیار گلخانه	-	۳ در هزار با مشاهده اولین علائم و در تناوب با سایر قارچ کش ها	۹۹/۳/۲۶
۱۶۰	سیپرودینیل	سیپرودین	۵۰٪	WG	آتیه نگین فلات Shaanxi hengrun chemical industry	پوسیدگی خاکستری	انگور	۱۴ روز	۱ در هزار	۱۴۰۱/۱۱/۳
۱۶۱	سیپرودینیل+فلودیوکسانیل	سویچ	۶۲/۵٪	WG	سینجتا	نکروز ساقه	گوچه فرنگی	۳ روز	۱ در هزار	۱۴۰۲/۵/۹

۱۴۰۲/۵/۹	۰/۸ در هزار	۳ روز	توت فرنگی	کپک خاکستری	سینجنتا	WG	۶۲/۵٪	سویچ	سیپرودینیل+فلودیوکسانیل	۱۶۲
۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱ در هزار	۷ روز	خیار	کپک خاکستری	سینجنتا	WG	۶۲/۵٪	سویچ	سیپرودینیل ۳۷.۵٪+فلودیوکسانیل ۲۵٪	۱۶۳
۹۸/۱۰/۹	۳ در هزار	-	توت فرنگی	کپک خاکستری	رهروان رویش سبز	SP	۶۲/۲٪	سراکوئیت	سولفات مس ۱۰۲+ فسفیت پتاسیم ۵۱۹	۱۶۴
۹۷/۱۲/۱۳	۰/۴ کیلوگرم در هکتار (مزرعه)	-	پیاز	سفیدک داخلی	خزر سم کود Zhejiang Sega	WG	۵۲/۵٪	اکولایزر	فاموکسادون+ سیموکسانیل	۱۶۵
۹۹/۶/۲۴	۴۰۰ گرم در هکتار	۱۴ روز	سیب زمینی	سفیدک کرکی	زرین خوشه جنوب Shanghai Shengnong	WG	۵۲/۵٪	زرین پرو	فاموکسادون+ سیموکسانیل	۱۶۶
۹۹/۴/۹	۰/۲۵ در هزار	۱۴ روز	انگور	سفیدک پودری	الیت ساوان OAT AGRO	EC	۵٪	گاتن	فلوتیانیل	۱۶۷
۹۷/۱۰/۱۷	۳ لیتر در هکتار (در تناوب با قارچ کش های رایج)	-	سنبله گندم	فوزاریوم	کیمیا سبزینه پویا جیانگ سو	SC	۲۵٪	لیانگدی	فناماکریل	۱۶۸

۱۶۹	فلودیکسانیل	سلسست	۱۰٪	FS	سینجنتا	شانکر ریزوکتونایی <i>Rhizoctonia solani</i>	سیب زمینی	۲۵۰ میلی لیتر به ازای ۱۰۰۰ کیلوگرم غده بذری	۱۴۰۱/۵/۱۰
۱۷۰	فلوکساپیروکساد	سرکادیس	۳۰٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	هلو	۰/۱۵ در هزار	۱۴۰۰/۴/۲۸
۱۷۱	فلوکساپیروکساد	سرکادیس	۳۰٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	انگور	۰/۱۵ در هزار	۱۴۰۰/۹/۱
۱۷۲	فوزتیل آلومینیوم	الیت	۸۰٪	WG	شاندونگ داچنگ	گموز	پسته	۲/۵ در هزار	۹۲/۱۲/۵
۱۷۳	فوزتیل آلومینیوم	رودر	۸۰٪	WP	دوگال	گموز	مرکبات	۲ در هزار	۹۶/۵/۲
۱۷۴	فوزتیل آلومینیوم	فیتوکیور	۸۰٪	WP	گل سم گرگان LiminChemical	انگومک	پسته	۲/۵ در هزار	۹۹/۱۰/۲۲
۱۷۵	فوزتیل آلومینیوم + فلوپیکولید	پروفایلر	۷۱/۱٪	WG	بایر آگ	سفیدک داخلی	انگور	۲-۲/۵ در هزار بسته به شدت بیماری در سه نوبت	۹۵/۸/۲۴
۱۷۶	کروزکسیم متیل	استروبی	۵۰٪	WG	ب آ اس اف	سفیدک پودری	کدوئیان	۰/۲ در هزار	۸۷/۵/۲
۱۷۷	کینوسول (سولفات ۸- هیدروکسی کینولین)	بلتانول	۳۷/۵٪	SL	سبا کوشا کشت پروبلت فیتو اسپانیا	بوته میری <i>Phytophthora melonis</i>	خیار (گلخانه و فضای باز)	۰/۵ در هزار (نوبت اول بلافاصله پس از کاشت و نوبت دوم بین مرحله ۲-۳ برگی همراه با آب آبیاری)	۹۸/۴/۱۰

۹۷/۱۰/۱۷	۰/۷ در هزار (استفاده بیش از دو نوبت متوالی و بیش از ۴ نوبت در یک دوره تولید ممنوع است.	۱ روز	خیار(گلخانه)	سفیدک داخلی	سینجنتا	SC	۵۰٪	کاریال استار	ماندی پروپامید+ دیفنوکونازول	۱۷۸
۱۴۰۲/۳/۲۹	۷۰۰ میلی لیتر در هکتار در مناطق مرطوب کناره های دریای خزر و سواحل خلیج فارس	۳ روز	گوچه فرنگی	لکه موجی - سفیدک داخلی	سینجنتا	SC	۵۰٪	کاریال استار	ماندی پروپامید+ دیفنوکونازول	۱۷۹
۹۷/۹/۲۶	۰/۳ در هزار (به صورت تناوبی با قارچ-کش-های دیگر)	-	سیب درختی	لکه سیاه	سبزمحصول داتیس ناگارجونا اگری کم	WP	۴۰٪	آتیس	مایکلوبوتانیل	۱۸۰
۸۶/۸/۲۸	یک بسته ۷ گرمی برای نگهداری ۵ کیلوگرم انگور	-	انگور	بیماریهای قارچی	اروم زرین خوشه	پد کاغذی	۷ گرم متا بی سولفیت	سولفور پد	متا بی سولفیت سدیم	۱۸۱
۹۶/۴/۱۹	۲ در هزار در مزرعه به صورت محلول ریزی پای بوته و در گلخانه به منظور ضد عفونی خاک جهت کنترل عامل بیماری فوق به مقدار ۲۰۰ گرم در هر متر مکعب خاک به صورت مخلوط با خاک	۷ روز	خیار	بوته میری در مزرعه و گلخانه	گیاه	WP	۷۲٪	داونی جی	متالاکسیل + مانکوزب	۱۸۲
۹۳/۲/۱۵	۲ در هزار در مزرعه به صورت محلول ریزی پای بوته و در گلخانه به منظور ضد عفونی خاک جهت کنترل عامل بیماری فوق به مقدار ۲۰۰ گرم در هر متر مکعب خاک به صورت مخلوط با خاک	۷ روز	خیار	بوته میری در مزرعه و گلخانه	بهاور شیمی	WP	۷۲٪	رزالاکسیل	متالاکسیل + مانکوزب	۱۸۳

۹۴/۷/۶	۳ کیلوگرم در هکتار	۷ روز	سیب زمینی	سفیدک داخلی	بهاور شیمی	WP	۷۲٪	رزالاکسیل	متالاکسیل + مانکوزب	۱۸۴
۹۹/۳/۱۲	۲/۵ کیلوگرم در هکتار	-	سیب زمینی	سفیدک داخلی	کیمیا گوهر خاک Leeds	WP	۷۲٪	منکوماکسیل	متالاکسیل ۸ درصد + مانکوزب ۶۴ درصد	۱۸۵
۹۹/۹/۱۷	۲ در هزار	-	خیار گلخانه	بوته میری	ایرمان UPL	WP	۷۲٪	منکولاکسیل	متالاکسیل ۸ درصد + مانکوزب ۶۴ درصد	۱۸۶
۹۹/۴/۹	۲/۵ در هزار	-	گوچه فرنگی	سفیدک داخلی	پیراکشت شیمی Industrias Quimicas Valles	SC	۲۲٪	آر متیل آر	متالاکسیل ۳/۵ درصد + هیدروکسید مس ۱۸/۵ درصد	۱۸۷
۱۴۰۰/۶/۱	۱ در هزار		ذرت	فوزاریوم	سینجنتا	FS	۳/۵٪	ماکسیم ایکس ال	متالاکسیل ام (مفنوکسام) ۱۰ گرم / لیتر + فلودیوکسانیل ۲۵ گرم / لیتر	۱۸۸
۹۹/۹/۱۷	۲ در هزار	-	خیار	بوته میری	اکسیر کشاورزی یزد Zhejiang Heben	GR	۵٪	ریدومکس	متالاکسیل	۱۸۹

۹۹/۹/۱۷	۲ در هزار	-	خيار	بوته ميري	گياه Zhejiang Heben	GR	۵٪	ردوكسيل	متالاكسيل	۱۹۰
۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۲ گرم در متر مربع (گلخانه) به صورت گرانول پاشي	-	خيار	بوته ميري <i>Pythium aphanidermatum</i>	گياه	GR	۵٪	ردوكسيل	متالاكسيل	۱۹۱
۹۸/۴/۱۰	۱/۵ ليتر در هزار	-	خيار(گلخانه و فضاى باز)	بوته ميري	سينجنتا	EC	۴۴/۶٪	يونيفورم	مفتوكسام ۱۲/۴٪ + آزوكسى استروبين ۳۲/۲٪	۱۹۲
۱۴۰۱/۹/۱	۳/۵ ليتر در هكتار در مناطق با آلودگى زياد	۱۴ روز	پياز	پوسيدگى فوزاريومى ريشه	گياه پرنياى اطلس	SC	۳/۵٪	مالوين ايكس ال ۰۳۵ FS	متالاكسيل ام ۱۰ گرم /ليتر +فلوديوكسانيل ۲۵ گرم /ليتر	۱۹۳
	۲/۵ ليتر در هكتار در مناطق با آلودگى كم				Safa Tarim					
۱۴۰۲/۵/۳۰	يك در هزار	۲۱ روز	انگور	سفيدك پودرى	ب آ اس اف	SC	۷/۵٪	رويونا	مفن ترى فلوكونازول	۱۹۴
۹۵/۶/۲۹	۳-۴ در هزار	صفر روز	خيار- گلخانه	سفيدك داخلى	JI Biotech	SL	۵۳٪	فسفايت	نمك هاى مونو و دى پتاسيم اسيد فسفونيك	۱۹۵
۱۴۰۰/۹/۲۹	۲/۵ در هزار	-	پسته	پوسيدگى فايوتقترائى ريشه و طوقه	بصير شيمى Agrichem	SL	۶۰٪	اگريفوس	نمك هاى مونو و دى پتاسيم اسيد فسفونيك	۱۹۶

۹۵/۱۰/۲۷	قبل از انتقال نشاء یک در هزار، یک هفته بعد از انتقال نشاء دو در هزار و دو هفته پس از سمپاشی دوم به مقدار ۲ در هزار	۱۰ روز	گوجه فرنگی	پژمردگی فوزاریمی	Mitsui	SL	۳۰٪	تاچی گارن	های مکسازول	۱۹۷
۱۴۰۰/۹/۱۵	۱/۲ در هزار	-	هلو	پیچیدگی برگ	بازارگان کالا ISAGRO	WG	۲۸٪	BADGE	هیدروکسید مس + اکسی کلرور مس	۱۹۸
۱۴۰۱/۵/۱۰	۲/۵ کیلوگرم در هکتار	سه روز	گوجه فرنگی	سفیدک کرکی	بازارگان کالا ISAGRO	WG	۲۸٪	BADGE	هیدروکسید مس + اکسی کلرور مس	۱۹۹
۹۶/۸/۲۹	مزرعه: ۱۰ در هزار گلخانه: ۷/۵ در هزار	-	خیار	سفیدک پودری	بازرگان کالا Jh biotech	SL	۸۳٪	میلدی کیور	عصاره سیر ، روغن پنبه دانه، روغن ذرت	۲۰۰
۹۸/۱۰/۹	۴ در هزار	ندارد	توت فرنگی	کپک خاکستری	روماک گستر غرب	EC	۶۰٪	روماک	اسانس روغن بنه	۲۰۱



0911 728 6307

www.dehkadesabze-shomalgan.ir

داروخانه گیاه پزشکی: دهکده سبز شمالگان

دکتر شیدا شیرین بیک مهاجر



t.me/dehkadesabze_shomalgan



@dr_shila_shirinbeik.65